

# Introduction to Estimation

Applied Statistics

Fall 2025

## 目录

<b>1 统计推断 (Statistical Inference)</b>	<b>3</b>
1.1 两种推断类型 (Two Types of Inference)	3
<b>2 估计 (Estimation)</b>	<b>3</b>
2.1 点估计 (Point Estimators)	3
2.2 点估计量的性质 (Qualities of Estimators)	4
2.2.1 无偏估计量 (Unbiased Estimators)	4
2.2.2 一致性 (Consistency)	4
2.2.3 相对有效性 (Relative Efficiency)	5
2.3 区间估计 (Interval Estimation)	5
2.3.1 区间估计的基本思想	5
2.3.2 经验法则	6
2.3.3 使用模拟解释置信区间	6
<b>3 置信区间 (Confidence Interval)</b>	<b>7</b>
3.1 构建总体均值的置信区间	7
3.2 常见临界 Z 值 (Common Critical z Values)	8
3.3 区间宽度 (Interval Width)	9
3.3.1 影响区间宽度的因素	10
<b>4 选择样本量 (Selecting the Sample Size)</b>	<b>11</b>
<b>5 如何估计 <math>\sigma</math>?</b>	<b>12</b>
5.1 方法 1: 抽取初步样本	12
5.2 方法 2: 使用关于分布形式的先验知识	12
5.3 方法 3: 使用经验法则	12
5.4 方法 4: 对于计数数据	12

## Outline

1. 点估计与区间估计 (Point and interval estimators)
2. 估计量的性质 (Qualities of estimators)
3. 置信区间 (Confidence intervals)
4. 确定样本量 (Determine the sample size)

## 1 统计推断 (Statistical Inference)

- **统计推断 (Statistical inference):** 使用样本数据对总体做出结论
- 它以概率的形式表达我们对结论的信心程度
- 有效性需要随机抽样
- 对于数据生产中的基本缺陷（如自愿回应样本）导致的非抽样误差，无法补救

### 1.1 两种推断类型 (Two Types of Inference)

- **估计 (Estimation):** 使用区间估计总体参数 (population parameter) 的值  
示例: ”估计医院的平均等待时间”
- **假设检验 (Hypothesis Tests):** 评估关于总体 (population) 的某个主张的证据  
示例: ”检验平均等待时间是否超过 20 分钟”
- 在两种技术中，我们都问: ”如果我们多次使用推断方法，会发生什么?”

## 2 估计 (Estimation)

- **估计 (Estimation):** 基于样本统计量确定总体参数的近似值
- **估计量 vs. 估计值 (Estimator (random variable) vs. Estimate (number)):**
  - ”估计量是一个规则或公式”
  - ”估计值是从样本计算出的数值”
- **两种估计量 (Two types of estimators):** 点估计量和区间估计量

### 2.1 点估计 (Point Estimators)

- 点估计使用单个值或点来估计参数
- 样本均值  $\bar{X}$  是总体均值  $\mu$  的点估计
- 样本标准差  $s$  是  $\sigma$  的点估计

## 2.2 点估计量的性质 (Qualities of Estimators)

在选择点估计量时，我们寻找具有最佳统计性质的估计量：

- 无偏性 (Unbiasedness): 期望值等于参数的估计量
- 一致性 (Consistency): 随着样本量增大，估计量与参数之间的差异变小
- 相对有效性 (Relative efficiency): 方差 (variance) 较小的估计量

### 2.2.1 无偏估计量 (Unbiased Estimators)

- 总体参数的无偏估计量是其期望值 (expected value) 等于该参数的估计量
- 样本均值  $\bar{X}$  是总体均值  $\mu$  的无偏估计量:  $E(\bar{X}) = \mu$
- 当总体对称时，样本中位数也是总体均值  $\mu$  的无偏估计量
- 样本方差  $s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$  是总体方差  $\sigma^2$  的无偏估计量  
相比之下， $\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}$  是有偏 (biased) 估计量

### 样本方差的无偏性证明 (Unbiasedness of the Sample Variance)

设  $X_1, \dots, X_n$  为独立同分布的随机变量，均值为  $\mu$ ，方差为  $\sigma^2$ 。样本方差定义为：

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

关键思路：展开平方偏差的和：

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2$$

两边取期望：

$$\mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = n\sigma^2 - n\text{Var}(\bar{X}) = n\sigma^2 - n \left( \frac{\sigma^2}{n} \right) = (n-1)\sigma^2$$

除以  $n-1$ ：

$$\mathbb{E}[s^2] = \sigma^2$$

### 2.2.2 一致性 (Consistency)

- 如果随着样本量增大，估计量与参数之间的差异变小，则该估计量是一致的
- $\bar{X}$  是  $\mu$  的一致估计量，因为随着  $n$  增大， $\bar{X}$  的方差  $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$  变小
- 对于正态总体，样本中位数是  $\mu$  的一致估计量:  $\text{Var}(\text{样本中位数}) = \frac{2\pi\sigma^2}{4n} \approx \frac{1.57\sigma^2}{n}$

### 一致性的形式定义 (Formal Definition of Consistency)

一致性正式定义为以概率收敛 (converge in probability) 于参数的真实值，例如：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Pr(|\bar{x} - \mu| > \epsilon) = 0 \quad \text{对所有 } \epsilon > 0$$

如果四阶矩 (fourth moment) 有限，样本方差  $s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$  是总体方差  $\sigma^2$  的一致估计量 (consistent estimator)。

在相同条件下， $\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}$  也是总体方差  $\sigma^2$  的一致估计量。

### 2.2.3 相对有效性 (Relative Efficiency)

如果有两个参数的无偏估计量，方差较小的那个被称为相对有效的。例如，对于正态总体，样本中位数和样本均值都是总体均值的无偏估计量。样本中位数的方差大于样本均值的方差：

$$Var(\text{样本中位数}) = 1.57 \times Var(\bar{X})$$

因此  $\bar{X}$  相对更有效。

## 2.3 区间估计 (Interval Estimation)

- 区间估计给出总体参数的一个合理值范围
- 区间估计围绕点估计构建：中心  $\pm$  边际误差




图 1: 点估计量与区间估计量的比较

### 2.3.1 区间估计的基本思想

我们想要确定总体均值  $\mu$  的合理值区间。

假设有一个正态总体，均值  $\mu$ ，标准差为 20。我们抽取一个样本量为 16 的样本，样本均值为 240.79。

我们可以猜测  $\mu$  ”大概” 在 240.79 附近。那么， $\mu$  可能有多接近 240.79 呢？

为了回答这个问题，我们必须问另一个问题：如果从总体中抽取许多大小为 16 的简单随机样本，样本均值  $\bar{x}$  会如何变化？

在重复抽样中，样本均值的值将服从均值为  $\mu$ 、标准差为 5 的正态分布。




图 2: 区间估计示例

### 2.3.2 经验法则

经验法则 (empirical rule) 告诉我们, 在所有大小为 16 的样本中, 95% 的样本均值将在  $\mu$  的 10 个单位内 (两个标准差)。




图 3: 样本均值的抽样分布

如果样本均值在  $\mu$  的 10 个单位内, 那么  $\mu$  就在样本均值的 10 个单位内:

$$\mu - 10 \leq \bar{x} \leq \mu + 10 \quad \leftrightarrow \quad \bar{x} - 10 \leq \mu \leq \bar{x} + 10$$

从样本均值下方 10 个点到上方 10 个点的区间将在约 95% 的所有大小为 16 的样本中”捕获”  $\mu$ 。

如果我们估计  $\mu$  在 230.79 到 250.79 之间的某个区间内, 我们将使用一种方法, 在该大小的所有可能样本中约 95% 的情况下捕获真实的  $\mu$ 。

### 2.3.3 使用模拟解释置信区间

考虑估计均匀分布  $U(0, 100)$  数据的样本均值, 其中  $\mu = 50$ ,  $\sigma = \frac{100}{\sqrt{12}} = 28.9$ 。

我们抽取大小为  $n = 100$  的样本并计算样本均值。95% 置信区间估计量为  $\bar{X} \pm 5.8$ 。如果我们重复抽样多次，95% 的  $\bar{X}$  值将使  $\mu$  位于  $\bar{X} \pm 5.8$  区间内，5% 将产生不包括  $\mu$  的区间。




图 4: 置信区间的模拟情况

### 3 置信区间 (Confidence Interval)

置信区间: 估计值  $\pm$  边际误差, 具有一定置信度 (degree of interval)

- 置信度表示区间捕获真实参数的可能性
- 常见置信度  $1 - \alpha$ : 99%, 95%, 90%
- "95% 的置信区间并不意味着真实均值在此特定区间内的概率是 95%"
- 相反, 该方法产生的区间在重复抽样中 95% 的情况下包含真实均值

#### 3.1 构建总体均值的置信区间

回顾样本均值的抽样分布:

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$$

标准化给出  $Z$  统计量:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

要构建  $1 - \alpha$  置信区间, 我们从以下概率陈述开始:

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

这是关于  $\bar{X}$  的概率陈述:

$$P\left(\mu - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X} < \mu + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

将其解释为  $\mu$  的区间估计量, 我们得到  $(1 - \alpha)$  置信区间:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

边际误差:  $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

### 3.2 常见临界 Z 值 (Common Critical z Values)

我们可以使用  $z/t$  值表来查找  $Z_{\alpha/2}$ , 也可以使用软件查找临界  $z$  值。

$z^*$	0.674	0.841	1.036	1.282	1.645	1.960	2.054	2.326	2.576	2.807	3.091	3.291
置信水平 C	50%	60%	70%	80%	90%	95%	96%	98%	99%	99.5%	99.8%	99.9%

表 1: 常见置信水平对应的临界  $z$  值

#### 计算机需求示例

为了改进库存规划, 公司需要估计平均需求。经理注意到交货期内的需求服从正态分布。假设经理知道标准差为 75 台计算机。经理希望得到平均需求的 95% 置信区间估计。他记录了 25 个交货期的需求。从数据中, 我们计算出平均需求为 370.16 台。

**解答:** 已知:  $\bar{X} = 370.16$ ,  $\sigma = 75$ ,  $n = 25$ , 置信水平  $1 - \alpha = 0.95$

临界值:  $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

标准误:  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{75}{\sqrt{25}} = \frac{75}{5} = 15$

边际误差:  $z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \times 15 = 29.4$

置信区间:  $370.16 \pm 29.4 = (340.76, 399.56)$

**解释:** 平均需求的 95% 置信区间在 340.76 到 399.56 之间。

**置信区间解释**

不要解释为“总体均值在 340.76 和 399.56 之间的概率为 95%”，因为这意味着总体均值是一个我们可以做出概率陈述的变量。

置信区间估计量是关于样本均值的概率陈述。

**正确解释：** 置信区间在 95% 的情况下可能捕获总体均值。

**练习题：滑雪度假村客人年龄**

滑雪度假村客人的年龄通常呈右偏分布。假设年龄的标准差为 14.5 岁。

1. 随机样本中 40 位客人平均年龄  $\bar{X}$  的分布形状是什么？
2. 从 40 位客人的随机样本中，平均年龄为 36.4 岁。求  $\mu$ （滑雪度假村客人的真实平均年龄）的 95% 置信区间。
3. 解释你的结果。

**解答：**

1. 根据中心极限定理，对于样本量  $n = 40$ （大于 30），样本均值的分布近似正态，尽管原始总体是右偏的。
2. 已知： $\bar{X} = 36.4$ ， $\sigma = 14.5$ ， $n = 40$ ， $z_{\alpha/2} = 1.96$   
 标准误： $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{14.5}{\sqrt{40}} \approx 2.29$   
 边际误差： $1.96 \times 2.29 \approx 4.49$   
 置信区间： $36.4 \pm 4.49 = (31.91, 40.89)$
3. 我们有 95% 的信心认为，滑雪度假村客人的真实平均年龄在 31.91 岁到 40.89 岁之间。

**3.3 区间宽度 (Interval Width)**

- 宽区间提供的信息很少
- 比较两个估计：
  - 以 95% 置信度，会计师的平均起薪在 \$15,000 到 \$100,000 之间
  - 以 95% 置信度，起薪的置信区间估计在 \$42,000 到 \$45,000 之间
- 当你试图决定是否获得 CPA 证书时，哪一个更有帮助？
- 宽度取决于置信度  $1 - \alpha$ 、离散程度  $\sigma$  和样本量  $n$




图 5: 不同置信水平对区间宽度的影响




图 6: 不同  $\sigma$  对区间宽度的影响

### 3.3.1 影响区间宽度的因素

- 较大的置信水平产生较宽的置信区间
- 较大的  $\sigma$  值产生较宽的置信区间
- 增加样本量减小置信区间的宽度，而置信水平可以保持不变
- 注意：这也增加了获取额外数据的成本

## 4 选择样本量 (Selecting the Sample Size)

一旦我们决定了期望的估计精度，即置信区间的宽度和置信水平，我们就可以计算达到该精度所需的样本量。

表示期望的宽度为： $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq B$

估计均值的样本量：

$$n \geq \left( \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{B} \right)^2$$

### 计算机需求样本量计算

在收集数据之前，经理已经决定他需要在样本平均值周围 16 个单位内估计平均需求。因此边际误差为 16。

我们还有  $1 - \alpha = 0.95$  和  $\sigma = 75$ 。我们计算：

$$n = \left( \frac{z_{\alpha/2} \sigma}{B} \right)^2 = \left( \frac{1.96 \times 75}{16} \right)^2 = \left( \frac{147}{16} \right)^2 = (9.1875)^2 = 84.41$$

向上取整到 85。

这意味着要以 95% 的置信度确保估计误差不大于 16，我们需要随机抽样 85 个交货期区间。

### 练习题：西班牙洋葱重量

一名农产品经理希望以 95% 的置信度和  $\pm 1$  盎司的误差估计供应商交付的西班牙洋葱的平均重量。12 个洋葱的初步样本显示标准差为 3.6 盎司。

1. 我们应该称量多少个洋葱来求平均重量的置信区间？
2. 如果我们希望更准确，误差在  $\pm 0.5$  以内，样本量是多少？

解答：

1. 已知： $B = 1$ ， $\sigma \approx 3.6$ ， $z_{\alpha/2} = 1.96$   
 $n \geq \left( \frac{1.96 \times 3.6}{1} \right)^2 = (7.056)^2 = 49.79$   
 向上取整到 50。需要称量 50 个洋葱。

2. 对于  $B = 0.5$ ：  
 $n \geq \left( \frac{1.96 \times 3.6}{0.5} \right)^2 = (14.112)^2 = 199.2$   
 向上取整到 200。需要称量 200 个洋葱。

## 5 如何估计 $\sigma$ ?

当总体标准差未知时，我们需要估计它来计算样本量。

### 5.1 方法 1：抽取初步样本

计算小规模试点样本的样本标准差  $s$ 。

### 5.2 方法 2：使用关于分布形式的先验知识

假设保守的均匀分布  $U(a, b)$ ，基于上限和下限估计  $\sigma$ ：

$$\sigma \approx \frac{b - a}{\sqrt{12}}$$

示例：如果已知卡车重量范围从 1500 公斤到 3500 公斤，那么：

$$\sigma \approx \frac{3500 - 1500}{\sqrt{12}} \approx 577 \text{ 公斤}$$

### 5.3 方法 3：使用经验法则

对于近似正态的数据，值通常落在  $\mu \pm 3\sigma$  内，因此：

$$\sigma \approx \frac{\text{最大值} - \text{最小值}}{6}$$

示例：如果交货时间通常在 20 到 50 分钟之间，那么：

$$\sigma \approx \frac{50 - 20}{6} = 5 \text{ 分钟}$$

### 5.4 方法 4：对于计数数据

假设泊松到达并猜测均值，然后使用  $\sigma = \sqrt{\lambda}$ 。

示例：如果平均每小时有 20 位顾客到达，那么：

$$\sigma = \sqrt{20} \approx 4.47$$

## Summary

- **统计推断 (Statistical Inference):**
  - 使用样本数据对总体做出结论
  - 以概率形式表达置信度
  - 有效性需要随机抽样
- **估计类型 (Types of Estimation):**
  - **点估计 (Point Estimation):** 使用单个值估计参数
  - **区间估计 (Interval Estimation):** 使用值范围估计参数
- **估计量的性质 (Qualities of Estimators):**
  - **无偏性 (Unbiasedness):**  $E(\hat{\theta}) = \theta$
  - **一致性 (Consistency):** 随着  $n \rightarrow \infty$ ,  $\hat{\theta} \rightarrow \theta$
  - **相对有效性 (Relative Efficiency):** 方差较小的无偏估计量更有效
- **置信区间 (Confidence Intervals):**
  - 形式: 估计值  $\pm$  边际误差
  - 置信水平  $1 - \alpha$ : 区间捕获真实参数的概率
  - 对于正态总体, 均值  $\mu$  的置信区间:  $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- **区间宽度的影响因素 (Factors Affecting Interval Width):**
  - 置信水平: 置信水平越高, 区间越宽
  - 总体变异性:  $\sigma$  越大, 区间越宽
  - 样本量:  $n$  越大, 区间越窄
- **样本量确定 (Sample Size Determination):**
  - 给定期望边际误差  $B$ , 样本量  $n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{B}\right)^2$
  - 需要估计  $\sigma$  的方法: 初步样本、先验知识、经验法则
- **关键公式 (Key Formulas):**
  - 置信区间:  $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
  - 边际误差:  $B = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
  - 样本量:  $n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{B}\right)^2$

- **常见误解 (Common Misconceptions):**
  - 置信区间不是” 参数在区间内的概率”
  - 而是” 该方法产生的区间在重复抽样中以一定比例包含参数”
  
- **实际应用 (Practical Applications):**
  - 在商业、医学、社会科学等领域估计总体参数
  - 根据精度要求规划研究样本量
  - 正确解释置信区间的结果